

HERBE-INFO

N°2

Toujours beaucoup de pluie, mais un temps plus frais.

La Chambre d'agriculture vous donne rendez-vous tous les quinze jours pour **faire le point sur la pousse de l'herbe et la gestion des prairies**. Vous trouverez tout au long de l'année dans ces bulletins « **Herbe -Info** » des conseils de saison pour vous aider à gérer l'herbe au mieux en préservant sa qualité et son appétence..

3 nouvelles stations météo font leur apparition cette année pour compléter les mesures : Dourgne, Anglès et Murat-sur-Vèbre. Vous aurez ainsi un panel d'altitude et de localisation représentatif du département.

Rappel sur les sommes de températures :

Cette méthodologie permet de connaître et donc d'anticiper les dates-clé des stades physiologiques les plus importants de la croissance de l'herbe. Les sommes de températures sont exprimées en degrés-jours. Pour les calculer, on réalise, depuis le 1er février de l'année, un cumul des moyennes journalières avec un minimum à 0°C (une moyenne négative sera égale à 0°C) et un maximum à 18° C (une moyenne supérieure à 18°C sera plafonnée à 18°C).

Voici les sommes de températures optimales pour une première exploitation de l'herbe en fonction du type de prairie :

	Mise à l'herbe
Prairie temporaire précoce	250°C jour
Prairie permanente fertile	300°C jour
Prairie permanente tardive	400°C jour

L'actualité de la semaine :

Depuis la semaine dernière, la pluie continue de tomber avec des cumuls importants par endroits (plus de 50 mm en 7 jours sur les Monts de Lacaune). Les températures tendent à se rafraichir depuis le début du mois.

Observons les sommes de températures depuis le 1° février de ces 7 postes météo :

Date du relevé		10/3/24					
	Somme T°C				2024		
	Altitude	2024	2023	2022	Normale 2013-2023	T° moy sur 7 j	Précipitations (mm sur 7 j)
Albi	172 m	357°	243°	325°	304°	8°	37
Dourgne	202 m	360°	261°	341°		8°	2
Tanus	537 m	282°	218°	269°	241°	6°	38
Montredon Lab.	566 m	275°	228°	275°	260°	5°	26
Anglès	750 m	226°	144°	203°		4°	51
Lacaune	820 m	201°	126°	154°		4°	57
Murat	1022 m	204°	132°	158°		3°	69

Les 250°C jour ont été atteints **à 600m d'altitude**, et on atteint déjà les 350°C **en plaine et coteaux**. On voit que pour ces stations on se rapproche des cumuls de 2022 en restant plus précoce que la moyenne décennale. Comme la semaine dernière, la

mise à l'herbe doit se faire dès que les conditions de portance le permettent. Privilégiez les parcelles bien implantées ou les prairies permanentes sur des temps de séjour courts (1 à 2 h/jour) pour éviter de dégrader les prairies. L'humidité des sols va rendre la pousse de l'herbe explosive dès que les températures vont remonter, profitez de tous les créneaux pour sortir et effectuer la transition alimentaire. Vu les conditions météo, l'herbe risque d'être particulièrement riche en azote soluble...

Dans les zones plus élevées (700 à 1000m), on a atteint les 200°. La mise à l'herbe approche, avec ces températures nous serons à 250° dans 10-15 jours. Les sols limono-sableux permettront une meilleure portance sur ce secteur. Il est temps de mettre en place les clôtures pour être prêt au bon moment.

Le déprimage, pourquoi et comment faire ?

Le déprimage consiste à faire pâturer en fin d'hiver des surfaces hors de la sole de pâture de printemps, qui seront fauchées en 1^{ère} coupe.

Cela a plusieurs intérêts :

- Nettoyer les parcelles où la végétation serait haute avec des feuilles âgées et sèches (dactyle, agrostis). Cela fera de la lumière bénéfique aux légumineuses et au tallage des graminées.
- Sortir les animaux plus tôt en allongeant le 1er tour de pâture, ce qui diminue les besoins en stocks. En ajoutant des surfaces supplémentaires qui ne seront pas pâturées au tour suivant, cela permet aussi de gagner de la souplesse sur ce tour où la pousse de l'herbe est assez variable.
- Retarder l'épiaison des graminées d'environ 15 jours. On gagne ainsi de la souplesse au moment des récoltes.

Les précautions à prendre :

- Surveiller l'avancée de la pousse de l'herbe sur les parcelles qui seront pâturées au 2^{ème} tour. Il ne s'agit pas de se faire dépasser !
- Arrêter le déprimage avant les 500° jour. A cette date, les graminées précoces atteignent le stade épi 10 cm et le pâturage peut détruire les épis. Au-delà, on obtiendra une repousse plus feuillue mais moins de rendement, ce qui peut être intéressant si l'on vise la qualité ou problématique si l'on cherche à remplir la grange !

À notre prochain rendez-vous dans quinze jours.

Caroline Auguy et Alexis Gangneron

14 mars 2024

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

